

14 糖尿患者の血糖コントロール

※糖尿病の治療には運動療法、食事療法、薬物療法があります。運動療法や食事療法の実施を正確に把握するのは難しいため、薬物療法を受けている患者のうち適切に血糖コントロールがなされているかをみることにしました。より高い値が望ましい。

調査対象期間	分母数	分子数	コントロール率
2011年07月～2012年06月	859	428	49.8%
2011年10月～2012年09月	858	465	54.2%
2012年01月～2012年12月	852	450	52.8%
2012年04月～2013年03月	881	482	54.7%
2012年07月～2013年06月	894	504	56.4%
2012年10月～2013年09月	888	518	58.3%
2013年01月～2013年12月	829	485	58.5%
2013年04月～2014年03月	827	410	49.6%
2013年07月～2014年06月	753	402	53.4%
2013年10月～2014年09月	924	495	53.6%
2014年01月～2014年12月	872	448	51.4%
2014年04月～2015年03月	900	457	50.8%
2014年07月～2015年06月	930	475	51.1%
2014年10月～2015年09月	952	493	51.8%
2015年01月～2015年12月	946	498	52.6%
2015年04月～2016年03月	953	516	54.1%
2015年07月～2016年06月	970	484	49.9%
2015年10月～2016年09月	963	531	55.1%
2016年01月～2016年12月	957	507	53.0%
2016年04月～2017年03月	930	460	49.5%
2016年07月～2017年06月	922	453	49.1%
2016年10月～2017年09月	936	469	50.1%
2017年01月～2017年12月	921	445	48.3%
2017年04月～2018年03月			

(参考 QI 推進事業参加病院の平均値 2014年度 53.3% (前年比-0.7)
2015年度 52.3% (前年比-1.0))