

守れ腎臓!

ふじえだCKDネットが守ります!!
(慢性腎臓病)



腎臓の働きを示す値が低い人に対し、お薬手帳カバーにシールをはり、腎臓の働き具合に合った薬の処方などをするための目印とします。

- ① 薬の量を調節します
 - ② 腎臓の負担を軽くします
 - ③ 健診で早期発見!
- 腎機能に見合った薬の処方
減塩のすすめ
健診のすすめ

成人の8人に1人が慢性腎臓病 (CKD)といわれています。

慢性腎臓病は自覚症状もなく進行し、心筋梗塞や脳梗塞、脳出血を起こす原因にもなります。

「守れ腎臓！ ふじえだCKDネット」

2016年3月1日始動

守れ腎臓！ ふじえだCKDネット

藤枝市健康推進課：Check! CKDシールを市内薬局に配布

保健師：特定健診ハイリスク訪問時に eGFRを確認し、

“Check CKD”シールをお薬手帳に貼る。

医師：院外処方箋とeGFRやCrの検査データを患者に渡す。

薬剤師：eGFRを確認し“Check CKD”シールをお薬手帳に貼る。調剤内容をチェックし、医師に疑義照会、情報提供をする。“CKDでの投薬ダブルチェック体制”



70歳未満 $30 \leq eGFR < 50$
70歳以上 $30 \leq eGFR < 40$
(推計2,300人)



eGFR < 30
(推計500人)



守れ腎臓！ ふじえだCKDネット

ポスター、マニュアルの配布

守れ腎臓！

ふじえだCKDネットが守ります！！
(慢性腎臓病)



腎臓の働きを示す値が低い人に対し、お薬手帳カバーにシールをはり、腎臓の働き具合に合った薬の処方などをするための目印とします。

- ① 薬の量を調節します 腎機能に見合った薬の処方
- ② 腎臓の負担を軽くします 減塩のすすめ
- ③ 健診で早期発見！ 健診のすすめ

成人の8人に1人が慢性腎臓病(CKD)といわれています。

慢性腎臓病は自覚症状もなく進行し、心筋梗塞や脳梗塞、脳出血を起こす原因にもなります。

ふじえだCKDネット【志大医師会・藤枝薬剤師会・藤枝市立総合病院・藤枝市】協賛：静岡県慢性腎臓病対策協議会

“守れ腎臓！ふじえだCKDネット”マニュアル



藤 枝 市

マニュアル

- 2. かかりつけ医の先生にお願いしたい
CKD ; chronic kidney disease (慢性腎臓病) 診療

ポスター

守れ腎臓！ ふじえだCKDネット

CKD指導看護師によるCKD指導のパンフレット

慢性腎臓病(CKD) について



藤枝市立総合病院 腎臓内科・人工透析室
H27年2月1日

目次

腎臓の位置	1
腎臓の働き	2
慢性腎臓病とは	3
CKDの重症度分類	4
腎臓が悪くなると	5
食事療法	6-10
たんぱく質制限 塩分制限 カリウム制限 糖尿病を合併している場合	
日常生活について	11-12
薬物療法	13
検査	14-15
末期腎不全の治療法	16-17
医療費	18

守れ腎臓！ ふじえだCKDネット

健康推進課


志太医師会

藤枝
薬剤師会

藤枝市立
総合病院

管理栄養士
保健師


受診結果
連絡票



CKD診療連携医




情報提供



院内・院外
保険薬局薬剤師




情報提供




腎臓内科専門医
CKD指導看護師
管理栄養士
薬剤師

受診勧奨※



受診



紹介状



市民(特定健診受診者)
CKD患者



特定健診ハイリスク訪問
※eGFR: 20歳～69歳は50未満
70歳以上は40未満